



VIGNETTE		CSPO
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES		
Type d'échantillon	Commentaire prélèvement	Analyses demandées
SANG EDTA ou hépariné	Au moment de la crise : prélever un tube de sang complet EDTA ou un tube de sang hépariné, conserver au froid (frigo à 4°C) et à l'abri de la lumière (envelopper l'échantillon dans du papier alu).	☐ Protoporphyrine libre érythrocytaire
		☐ Zinc-protoporphyrine érythrocytaire*
COMMENTAIRE À L'ENCODAGE (LABO)		
Conservé dans du papier alu au froid à 4°C, l'échantillon doit arriver dans les 3 jours au labo de Biochimie Spéciale Manuelle de l'Hôpital Erasme		
ENVOI		
Hôpital Erasme, Chimie secteur Biochimie Spéciale Manuelle (BSM)		
COMMENTAIRE AUX CLINICIENS		
PROTOPORPHYRIE ÉRYTHROPOÏÉTIQUE Pathologie essentiellement cutanée: photosensibilisation érythémateuse douloureuse oedémateuse type coup de soleil SANS BULLES, commence en général dans l'enfance. Pour retenir ce diagnostic, il faut que la clinique corresponde. En présence de bulles ou de douleurs abdominales, on peut éliminer ce diagnostic. Le dosage de la protoporphyrine libre érythrocytaire permet le diagnostic. *Dans la plupart des laboratoires, la Zinc-protoporphyrine sera dosée en même temps que la protoporphyrine libre érythrocytaire dont elle diffère. Sa valeur augmente dans les carences en fer et l'intoxication au plomb.		
Contact à Erasme	Prof. Frédéric Cotton, Pharm PhD Chef de Clinique - Biochimie spéciale Service de Chimie médicale - Hôpital Erasme Tél 02 555 51 56 - Fax 02 555 66 55 frederic.cotton@ulb.ac.be	